

GALLMED (enterosolvens) tabletta
(OGYI által jóváhagyott betegtájékoztató)

Természetes alapanyagokból álló, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását irodalmi és népgyógyászati adatok igazolják.

Összetétel: 7 féle gyógynövény (szennalevél, édeskömény, fehérürömfű, pemetefű, fehérmályvagyökér, édesgyökér és mentalevél), epesavak.

Javallatok: 1. Az epetermelés és az epeutak működési rendellenességeivel összefüggő panaszok csökkentése, megszüntetése:

- epeürülés fokozása, epehajtás elősegítése,
- epekő képződés veszélyeinek csökkentése,
- epehólyag eltávolítás után az epevezeték működési rendellenessége következtében jelentkező panaszok enyhítése, megszüntetése,

2. Emésztőrendszeri panaszok csökkentése, megszüntetése, különös tekintettel a (gyomor) túlterhelésére.

Székelési panaszok (rendszeretlen, kemény széklet, stb.) rendezése (székletszabályozás)

3. A koleszterinszint előnyös befolyásolása.

Adagolás: Kúraszerűen célszerű alkalmazni, szükség esetén alkalmi szedése is megengedett.

Naponta 1-3 x 1-2 tabletta **főétkezések előtt**. Kúraszerűen alkalmazva:

	egy kúra időszakai	délben	este	naponta összesen
1.	10 napig	-----	1 tabletta	1 tabletta
2.	10 napig	1 tabletta	1 tabletta	2 tabletta
3.	10 napig	1 tabletta	2 tabletta	3 tabletta
4.	10 napig	2 tabletta	2 tabletta	4 tabletta
5.	10 napig	2 tabletta	3 tabletta	5 tabletta
6.	10 napig	3 tabletta	3 tabletta	6 tabletta

Valamelyik főétkezés bármilyen okból történő elmaradása esetén a tabletta szedését is el kell hagyni.

A fenti adagolástól egyénenként, a panaszoknak megfelelően el lehet térni, de naponta legfeljebb 6 tabletta bevétele ajánlott.

A kúra befejezése fokozatosan történjen, kétnaponta 1-1 tablettával csökkentve a napi adagot, a kúra elején alkalmazott fokozatos növelés fordítottjaként.

A kúra időtartama legfeljebb 6 hónap. A folyamatos szedés abbahagyása után javasolt az orvosi ellenőrzés annak érdekében, hogy a készítmény hatása ne fedjen el esetleg más kezelést (is) igénylő betegséget.

A kúrát célszerű megszakítás nélkül befejezni, de a megszakítás sem okoz problémát.

A kúra tetszés szerinti időközönként megismételhető.

Amennyiben a kúra(ák) hatására a panaszok egyáltalán nem enyhülnek vagy nemkívánatos hatások lépnek fel, úgy a kúrát meg kell szakítani és orvoshoz fordulni.

Ha a panaszok a szedés abbahagyásával visszatérnek, úgy orvosával egyeztetve napi 1-2 tabletta (a déli vagy esti főétkezés előtt) fenntartó adagként folyamatosan szedhető.

Ellenjavallat: - Heveny (epe) rohamok és epevezeték elzáródás okozta sárgaság esetén tilos alkalmazni.
- Terhesség és szoptatás esetén.

Mellékhatások: Az egyéni érzékenységtől függően, az első néhány napban enyhe hasmenés valamint a tabletta(k) bevétele után közvetlenül rövid ideig tartó émelygés előfordulhat. A hasmenés és az émelygés elviselhetetlensége esetén a tabletta szedését abba kell hagyni.

Gyógyszerkölcsonhatások:

A készítmény más készítménnyel, gyógyszerrel együtt szedhető, de a hatás vizsgálata érdekében célszerű más, hasonló hatású epesav tartalmú vagy egyéb epehajtó készítmény szedését a "Gallmed" kúra időtartamára abbahagyni.

Figyelmeztetés (megjegyzés):

Gyermekek a kezelőorvosnak a várható eredményre és kockázatokra vonatkozó előzetes mérlegelése alapján és utasítása szerint szedhetik.

A készítményt hőhatásoktól (napsugárzás, fűtőtest, stb.) és nedvességtől óvni kell.

A tabletta erős illata a készítmény sajátossága, nem jelent minőségromlást.

A tablettákat széttörve ne adagoljuk, mert rendkívül keserű ízhatást vált ki.

Felhasználhatóság: 3 év

Gyártó: PHARMAFONTANA Budapest

Forgalmazó: NICO Kft., 6500 Baja, Szarvas G. u. 3. Tel/Fax: (79)326581

Nyilvántartási, engedélyszám: OGYI- 503/1995.

A készítmény szabadalommal védett.