



A KÖR

1995. szeptember
5. évf. 9. szám

49 Ft

SZÁM- TAN- ÓRA

MOTTÓ:

Kapitány a gépháznak:
– Mennyi?
Gépház vissza:
– Húsz!
Kapitány:
– Mi húsz?
Gépház:
– Mi mennyi?

Ülök a Népjóléti Közlöny mellett és osztom, szorzom, 20,- Ft/hó/fő ügyelet finanszírozására. Napi 60 fillér fejenként.

Egy ideálisnak mondott praxis napi 960,- Ft-ot kaphat. 16 órára délután 4-től 8-ig. Vagyis 60,- Ft óránként.

Jelenleg egy napszám 1000,- Ft 10 órára. Ez óránként 100,- Ft, mellé pörkölt, reggel pálinka, napközben fröccs jár szőlőkapáláshoz adómentesen.

Mire elég 60,- Ft. Egy közepes minőségű sörre. Ami óránként elfogyasztva talán sok is a vesetubulusoknak. De ha ezt még a befizetendő TB járulék, nyugdíj járulék és Szja csökkenti, akkor már hideg vízre sem elég.

Ki fog ebből hétvégi ügyeletet szervezni?

Az a város, ahol a 100.000 lakos

miatt napi 60.000,- Ft jut egy ügyeleti napra és ebből frakkban is ügyelhet az orvos, és glasszékesztyű is jut a sofőrnek. És mit tehet egy doktor a zalai anyag, vagy a nyírségi homok közepén?

Othon ül a 60,- Ft-jáért, és lapozgatja Werbőczy Törvénykönyvét a röghözkötés címszónál?

Nem ez a megoldás! A rendelet bizonyíték arra, hogy az ügyelet finanszírozása az önkormányzat dolga az OEP hozzájárulásával és azt az orvos, a nővér csak törvényben előírt munkabérért vállalhatja, különben precedenst teremtve sorstársait is kiszolgáltatja.

Számolni tudni kell, és ha nem történt meg „előtte”, úgy legyen utólag!

Ne adjátok el a szabadságotokat egy üveg sörért!

Dr. Mráz János

TARTALOMBÓL

*Beszámoló a MÁOTE
küldöttgyűléséről*

Fontos levelek válaszok

*„Hogy a holnap biztos
legyen”*

„Kedves KÖR”

Vásárolj Magyarul

Vitaindító

Vállalkozók figyelmébe

Rendelet ismertetés

Az orrcseppek hatékonysága

Sok kis apró

*SOS elfogytak a
transzmittereim!*

GALLMED (enterosolvens) tabletta

Természetes anyagokból álló, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény az epe- és emésztőrendszeri bántalmak megelőzésére, panaszok kezelésére.

Összetétel:

Egy tabletta 100 mg epe kivonatot, (kb. 50 mg össz. cholsav tartalommal), valamint a species cholagoga alkotórészeit tartalmazza: (Sennae folium, Foeniculi fructus, Absinthii herba, Marubii herba, Altheae radix, Liquiritiae rhizoma et radix, Menthae piperitae folium.)

Bevezetés:

Az epezármazékokat, epesavakat a gyógyászat régóta és kiterjedten használja az emésztőszervi panaszok, tünetek enyhítésére és megszüntetésére. A népgyógyászati tapasztalatok alapján fejlesztették ki az epekő oldásra is használható epesó tartalmú készítményeket, melyek törzskönyveztetett gyógyszerekké váltak.

A drog komponensek keveréke (spec. cholagoga) régóta alkalmazott epehajtó szer. Több évtizedes gyakorlati tapasztalatra épülő fejlesztés eredménye az enterosolvens Gallmed filmtabletta, mely egyesíti a fenti hatásokat.

Alkalmazható:

epepanaszok megelőzésére, megszüntetésére, krónikus állapotok kezelésére az epehólyag és az epeutak megbetegedése esetén önmagában vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítésére.

Farmakológiai tulajdonság:

Az epe kivonatban lévő primer és secunder epesók choloretikus hatása ismert. Bizonyított, hogy az orálisan bejuttatott exogen epesavak az epeösszetételt nagymértékben javíthatják, a koleszterin újra oldott fázisba kerülhet, egyes kövek oldódhatnak, ill. azok képződését gátolhatják.

A species cholagogát, mint epehajtót gyakran használják, ajánlják, mivel a duodenumból kiinduló reflexfolyamat eredményeképp az epehólyag kiürülését váltja ki: az epetermelés és kiürülés szabályozásával a gyógyulást előmozdítja.

Farmakokinetika:

Az epesavak taurinnal ill. glycinnel conjugáltak. Deconjugacio után csaknem teljesen felszívódnak az ileum terminalis szakaszból. Megemelik az epesav pool-t fiziológias úton metabolizálódnak. A járulékos anyagok, ill. olajok a természeti hatóanyag utakon biotransformálódnak.

Alkalmazási terület:

A Gallmed rendszeresen szedve, kúrában használva az epe pangást megszünteti, ezzel a köképződés veszélyét csökkenti, gyakran fennálló bélhurutot is gyógyítja. Az enterohepatikus körfolyamat rendellenességeiből származó betegségek gyógyulását segítheti.

Ellenjavallatok:

- heveny eperohamok alatt,
- elzáródásos sárgaságban,
- terhesség esetén.

Mellékhatások:

A betegek jól tolerálják. Ritkán jeleznek keserű szájízt, ill. a szedés első napjaiban hígabb székürítést.

Adagolás:

Nagyobb étkezés, bizonytalan panaszok, epekőműtét után 1-1 tbl. evés előtt. Krónikus epebetegségben tartós híg epetermelés kiváltására kúraszerűen emelkedő adagban 1 tbl. esti bevételével indítva maximum 6 tbl. (délben 3, este 3 tbl.). A kúra leépítése folyamatosan történjék. 2 naponta 1-1 tbl-val csökkentve a beveendő mennyiséget.

Kiszerezés: 1 dobozban 2 bliszter (2x10 tablettá)

Eltarthatóság: 2 év

Nyt.sz.: OGYI-503/1995

Gyártó: PHARMAFONTANA Budapest

Forgalmazó: NICO Kft. 6500 Baja, Szarvas G. u. 3. Tel/Fax: (79) 326581

A készítmény szabadalommal védett.